



15 Ottobre 2026

Circolare numero 20

Prevenzione e gestione dei casi di pediculosi nell'Istituto

La prevenzione e la gestione della pediculosi in ambito scolastico si basano sulla collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari, seguendo le indicazioni del Ministero della Salute.

Prevenzione (Ruolo della Famiglia)

Controllo periodico: Ispezionare il cuoio capelluto del bambino (soprattutto nuca e dietro le orecchie) **almeno una volta alla settimana. No ai trattamenti preventivi:** Non usare prodotti antiparassitari in via preventiva; sono inutili e potenzialmente dannosi. **Comportamenti corretti:** Evitare di scambiare oggetti personali come cappelli, sciarpe, pettini, spazzole o fermagli.

Gestione dei Casi (In caso di infestazione)

Segnalazione: Se si rilevano pidocchi o lendini, i genitori devono informare **tempestivamente la scuola** (docenti o segreteria) per permettere l'attivazione dei controlli sulle altre classi nel rispetto della privacy.

Trattamento medico: Consultare il medico o il pediatra e applicare un **prodotto specifico** (come permetrina o piretrine), ripetendo l'applicazione dopo **7-10 giorni** per eliminare le ninfe nate dalle uova residue.

Rimozione manuale: Sfilare le lendini (uova) a mano o con un pettine fitto a denti stretti. Non è necessario tagliare i capelli. **Trattamento dell'ambiente e degli oggetti:** Lavare vestiti, lenzuola e asciugamani in lavatrice a **60°C**. Immergere pettini e spazzole in acqua calda a 54°C–60°C per 10 minuti. Chiudere gli oggetti non lavabili in un sacchetto di plastica sigillato per 7–10 giorni.